胆道癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8	21日間	BSA<1.25㎡　60mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　80mg/day 1.50㎡≦BSA　100mg/day
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8	21日間	
	シスプラチン	25mg/㎡	60分点滴			
S-1[A法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
S-1[B法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14	21日間	
GEM+CDDP+IMFINZI	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8	21日間	最大8コース その後、デュルバルマブ4週毎の メンテナンスへ
	シスプラチン	25mg/㎡	60分点滴			
	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1		

大腸癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
FOLFIRI	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
FOLFIRI＋BV	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1		
FOLFIRI＋RAM	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1		
FOLFIRI＋AFL	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	アフリベルセプト	4mg/kg	60分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
FOLFIRI＋Pani	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1		
FOLFIRI＋Cetu	イリノテカン	180mg /㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	セツキシマブ	400mg/kg(初回) 250mg(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8		
IRIS	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1	21日間	S-1　投与量 BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
	S-1	80mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
IRIS＋BV	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1	21日間	
	S-1	80mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
mXELIRI	イリノテカン	200mg/㎡	90分点滴	day 1	21日間	カペシタビン　投与量 BSA<1.31㎡　1800mg/day 1.31㎡≦BSA ＜1.69㎡　2400mg/day 1.69㎡≦BSA ＜2.07㎡　3000mg/day 2.07㎡≦BSA　3600mg/day
	カペシタビン	1600mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
mXELIRI＋BV	イリノテカン	200mg/㎡	90分点滴	day 1	21日間	
	カペシタビン	1600mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
mFOLFOX＋BV	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1		
mFOLFOX＋Pani	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
mFOLFOX＋Cetu	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	セツキシマブ	400mg/kg(初回) 250mg(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8		
SOX	オキサリプラチン	135mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25㎡ 80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡ 100mg/day 1.50㎡≦BSA 120mg/day
	S-1	80mg/㎡	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
SOX＋BV	オキサリプラチン	135mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	
	S-1	80mg/㎡	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
XELOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA＜1.36㎡ 2400mg/day 1.36㎡≦BSA＜1.66㎡ 3000mg/day 1.66㎡≦BSA＜1.96㎡ 3600mg/day 1.96㎡≦BSA 4200mg/day
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
XELOX＋BV	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
mFOLFOXIRI	イリノテカン	150mg /㎡	60分点滴	day 1	14日間	基本的に12コース目まで行い 以後、IRI, L-OHPなしの メンテナンスへ移行
	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
mFOLFOXIRI＋BV	イリノテカン	150mg /㎡	60分点滴	day 1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1		
ｾﾞﾛｰﾀﾞ＋BV	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	カペシタビン 投与量 BSA＜1.36㎡ 2400mg/day 1.36㎡≦BSA＜1.66㎡ 3000mg/day 1.66㎡≦BSA＜1.96㎡ 3600mg/day 1.96㎡≦BSA 4200mg/day
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
Lonsurf(TAS102)+Bev	トリフルリジン・チピラシル	添付文書参照のこと	1日2回 朝夕食後内服	day1-5, 8-12	28日間	トリフルリジン・チピラシル 5日内服2日休薬
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1 ,15		
S-1＋BV	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	BSA<1.25㎡ 80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡ 100mg/day 1.50㎡≦BSA 120mg/day
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
Cetuximabu	セツキシマブ	400mg/㎡(初回) 250mg/㎡(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8	14日間	
CPT-11 + Pani	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1	14日間	
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day1		
wCPT-11 + Cetu	イリノテカン	100mg/㎡	90分点滴	day1,8,15,22	42日間	
	セツキシマブ	400mg/㎡(初回) 250mg/㎡(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day1,8,15,22,29,36		
CPT-11 + Cetu	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day1,15,29	49日間	
	セツキシマブ	400mg/㎡(初回) 250mg/㎡(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day1,8,15,22,29,36,43		
PER+HER	ペルツズマブ	840mg/body(初回) 420mg/body(2回目以降)	60分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		

茅ヶ崎市立病院 薬局 2023年11月作成

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
ゼローダ[B法]	カペシタビン	添付文書参照	1日2回　朝夕食後内服	day 1-14	21日間	
ゼローダ[D法]	カペシタビン	添付文書参照	1日2回　朝夕食後内服	day 1-5	7日間	放射線併用
S-1[A法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
S-1[B法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14	21日間	
UFT+UZEL	UFT(テガフール・ウラシル)	300mg～600mg	1日3回に分けて	day 1-28	35日間	
	ホリナート	75mg	1日3回に分けて	day 1-28		
Lonsurf	トリフルリジン・チピラシル	添付文書参照のこと	1日2回　朝夕食後内服	day1-5, 8-12	28日間	5日内服2日休薬
Stivarga	レゴラフェニブ	160mg	1日1回　食後内服	day1-21	28日間	

食道癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
FP	フルオロウラシル	800mg/㎡	24時間かけて	day 1-5	28日間	
	シスプラチン	80mg/㎡	120分点滴	day 1		
FP+RT	フルオロウラシル	700mg/㎡	24時間かけて	day 1-5	28日間	放射線併用
	シスプラチン	70mg/㎡	120分点滴	day 1		
術前DCF	ドセタキセル	70mg/㎡	60分点滴	day 1	28日間	術前補助化学療法は3コースまで
	シスプラチン	70mg/㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル	750mg/㎡	24時間かけて	day 1-5		
DCF	ドセタキセル	30mg/㎡	60分点滴	day 1,15	28日間	
	シスプラチン	80mg/㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル	800mg/㎡	24時間かけて	day 1-5		
wPTX(7週毎)	パクリタキセル	100mg/㎡	60分点滴	day1,8,15,22,29,36	49日間	
OPDIVO	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
OPDIVO	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
OPDIVO+FP	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
	フルオロウラシル	800mg/㎡	24時間かけて	day 1-5		
	シスプラチン	80mg/㎡	120分点滴	day 1		
OPDIVO+YERVOY	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1, 22	42日間	
	イピリムマブ	1mg/kg	30分点滴	day 1		

胃癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
SP	シスプラチン	60mg/㎡	90分点滴	day 8	35日間	BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡ 100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-21		
SOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	S-1　投与量 BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
SOX＋T(HER)	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		
SOX＋OPDIVO	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1	21日間	S-1　投与量 BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1		
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
XP	シスプラチン	80mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	カペシタビン　投与量 BSA＜1.36㎡ 2400mg/day 1.36㎡≦BSA＜1.66㎡ 3000mg/day 1.66㎡≦BSA＜1.96㎡ 3600mg/day 1.96㎡≦BSA 4200mg/day
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
XP+T(HER)	シスプラチン	80mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg（初回） 6mg（2回目以降）	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		
XELOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	カペシタビン　投与量 BSA＜1.36㎡ 2400mg/day 1.36㎡≦BSA＜1.66㎡ 3000mg/day 1.66㎡≦BSA＜1.96㎡ 3600mg/day 1.96㎡≦BSA 4200mg/day
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
XELOX＋T(HER)	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1	21日間	
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg（初回） 6mg（2回目以降）	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		
XELOX＋OPDIVO	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1	21日間	
	オキサリプラチン	130mg/㎡	120分点滴	day 1		
	カペシタビン	2000mg/㎡	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
mFOLFOX6＋OPDIVO	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg /㎡	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
ENHERTU	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	90分点滴 2回目以降30分まで短縮可	day1	21日間	
wPTX	パクリタキセル	80mg/㎡	60分点滴	day1,8,15	28日間	
wPTX+HER	パクリタキセル	80mg/㎡	60分点滴	day1,8,15	28日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg（初回） 6mg（2回目以降）	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
wPTX+RAM	パクリタキセル	80mg/㎡	60分点滴	day1,8,15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1,15		
tri-w アブラキサン	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/㎡	30分点滴	day1	21日間	

茅ヶ崎市立病院　薬局　2023年11月作成

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
w アブラキサン	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/㎡	30分点滴	day1,8,15	28日間	
wアブラキサン+RAM	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/㎡	30分点滴	day1,8,15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1,15		
CPT-11[A法]	イリノテカン	100mg/㎡	90分点滴	day 1,8,15	28日間	
CPT-11[B法]	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1,15	35日間	
CPT-11[150]	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1	14日間	
CPT-11[B法]+HER	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1,15	35日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg（初回） 6mg（2回目以降）	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
5FU+Levofolinate	レボホリナート	250mg /㎡	120分点滴	day1,8,15,22,29,36	56日間	
	フルオロウラシル(bolus)	600mg /㎡	10分点滴	day1,8,15,22,29,36		
OPDIVO	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
OPDIVO	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
S-1[A法](4投2休)	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
S-1[B法](2投1休)	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14	21日間	
Lonsurf(TAS-102)	ロンサーフ	添付文書参照のこと	1日2回　朝夕食後内服	day1-5、day8-12	28日間	

GIST

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
SUTENT	スニチニブ	50mg /day	1日1回　内服	day 1-28	42日間	
Stivarga	レゴラフェニブ	160mg	1日1回　食後内服	day1-21	28日間	

肝癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
TECENTRIQ＋BV	アテゾリズマブ	1200mg/body	60分点滴	day 1	21日間	
	ベバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
Stivarga	レゴラフェニブ	160mg	1日1回　食後内服	day1-21	28日間	
IMFINZI＋IMJUDO	トレメリムマブ	300mg/body	60分点滴	day 1	28日間	トレメリムマブは初回のみ
	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1		

膵癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1、8	21日間	BSA<1.25㎡　60mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　80mg/day 1.50㎡≦BSA　100mg/day
	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14		
GEM＋アブラキサン	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	125mg/㎡	30分点滴	day1,8,15	28日間	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day1,8,15		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
GEM+TARCEVA	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
	エルロチニブ	100mg	1日1回　空腹時	連日内服		
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg /㎡	120分点滴	day 1	14日間	
	イリノテカン	150mg/㎡	90分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
オニバイド(nal-IRI)+FL	イリノテカン(リポソーム製剤)	70mg/㎡ *1	90分点滴	day 1	14日間	※1 UGT1A1遺伝子多型への減量開始用量は添付文書参照
	レボホリナート	200mg /㎡	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg /㎡	46時間持続点滴	day 1		
S-1[A法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25㎡　80mg/day 1.25㎡≦BSA ＜ 1.50㎡　100mg/day 1.50㎡≦BSA　120mg/day
S-1[B法]	S-1	備考参照	1日2回　朝夕食後内服	day1-14	21日間	

神経内分泌腫瘍

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
CDDP+CPT-11	イリノテカン	60mg/㎡	90分	day 1,8,15	28日間	
	シスプラチン	60mg/㎡	120分	day 1		
CDDP+ETP（＋RT）	エトポシド	100mg/㎡	120分	day 1-3	21～28日間	
	シスプラチン	80mg/㎡	120分	day 1		
CBDCA+VP-16	エトポシド	80mg/㎡	120分	day 1-3	21日間	
	カルボプラチン	AUC 5	60分	day 1		