

胆道癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	BSA<1.25m ² 60mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 80mg/day 1.50m ² ≤BSA 100mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14		
GEM+CDDP+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1	14日間	S-1 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	シスプラチン	25mg/m ²	60分点滴			
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-7		
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分点滴			
S-1[A法]	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-28	42日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
S-1[B法]	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14	21日間	
GEM+CDDP+IMFINZI	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	最大8コース その後、デュルバルマブ4週毎の メンテナンスへ
	シスプラチン	25mg/m ²	60分点滴			
	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1		
GEM+CDDP+KEYTRUDA	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	ペムプロリズマブは400mg/body 6週毎へ変更可能 8コース投与後はゲムシタビン+ペムプロリズマブへ
	シスプラチン	25mg/m ²	60分点滴			
	ペムプロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
大腸癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
FOLFIRI(150)	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
FOLFIRI(150)+BV	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1		
FOLFIRI(150)+RAM	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1		
FOLFIRI(150)+AFL	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	アフリベルセプト	4mg/kg	60分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考	
<u>FOLFIRI(150)+Pani</u>	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間		
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1			
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1			
<u>FOLFIRI(150)+Cetu</u>	イリノテカン	150mg / m ²	90分点滴	day 1	14日間		
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1			
	セツキシマブ	400mg/kg(初回) 250mg(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8			
<u>IRIS</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day	
	S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
<u>IRIS+BV</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1	21日間		
	S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1			
<u>mXELIRI</u>	イリノテカン	200mg/m ²	90分点滴	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.31m ² 1800mg/day 1.31m ² ≤BSA < 1.69m ² 2400mg/day 1.69m ² ≤BSA < 2.07m ² 3000mg/day 2.07m ² ≤BSA 3600mg/day	
	カペシタビン	1600mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
<u>mXELIRI+BV</u>	イリノテカン	200mg/m ²	90分点滴	day 1	21日間		
	カペシタビン	1600mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1			

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>mFOLFOX6</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
<u>mFOLFOX+BV</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>mFOLFOX+Pani</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1		
<u>mFOLFOX+Cetu</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
	セツキシマブ	400mg/kg(初回) 250mg(2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8		
<u>SOX</u>	オキサリプラチン	135mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	
	S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14		
<u>SOX+BV</u>	オキサリプラチン	135mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	
	S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		

S-1 投与量
 BSA<1.25m² 80mg/day
 1.25m²≤BSA < 1.50m² 100mg/day
 1.50m²≤BSA 120mg/day

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考	
<u>XELOX</u>	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
<u>XELOX+BV</u>	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間		
	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14			
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1			
<u>mFOLFOXIRI</u>	イリノテカン	150mg / m ²	60分点滴	day 1	14日間	基本的に12コース目まで行い 以後、IRI, L-OHPなしの メンテナンスへ移行	
	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1			
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1			
<u>mFOLFOXIRI+BV</u>	イリノテカン	150mg / m ²	60分点滴	day 1	14日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1			
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1			
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1			
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1			
<u>ゼローダ+BV</u>	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1			
<u>Lonsurf(TAS102)+Bev</u>	トリフルリジン・チピラシル	添付文書参照のこと	1日2回 朝夕食後内服	day1-5, 8-12	28日間	トリフルリジン・チピラシル 5日内服2日休薬	
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分点滴	day 1 ,15			

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>S-1+BV</u>	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>Panitumumab</u>	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
<u>Cetuximabu</u>	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day 1, 8	14日間	
<u>CPT-11 + Pani</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1	14日間	
	パニツムマブ	6mg/kg	60分点滴	day1		
<u>wCPT-11 + Cetu</u>	イリノテカン	100mg/m ²	90分点滴	day1,8,15,22	42日間	
	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day1,8,15,22,29,36		
<u>CPT-11 + Cetu</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day1,15,29	49日間	
	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	120分点滴 60分点滴	day1,8,15,22,29,36,43		
<u>PER+HER</u>	ペルツズマブ	840mg/body(初回) 420mg/body(2回目以降)	60分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		
<u>ゼローダ[B法]</u>	カペシタбин	添付文書参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14	21日間	
<u>ゼローダ[D法]</u>	カペシタбин	添付文書参照	1日2回 朝夕食後内服	day 1-5	7日間	放射線併用
<u>S-1[A法]</u>	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
<u>S-1[B法]</u>	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	
<u>UFT+UZEL</u>	UFT(テガフル・ウラシル)	300mg~600mg	1日3回に分けて	day 1-28	35日間	
	ホリナート	75mg	1日3回に分けて	day 1-28		
<u>Lonsurf</u>	トリフルリジン・チピラシル	添付文書参照のこと	1日2回 朝夕食後内服	day1-5, 8-12	28日間	5日内服2日休薬
<u>FRUZAQLA</u>	フルキンチニブ	5mg	1日1回 食後内服	day1-21	28日間	
<u>Stivarga</u>	レゴラフェニブ	160mg	1日1回 食後内服	day1-21	28日間	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
食道癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
FOLFOX6	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
FP	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間かけて	day 1-5	28日間	
	シスプラチニ	80mg/m ²	120分点滴	day 1		
FP+RT	フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間かけて	day 1-5	28日間	放射線併用
	シスプラチニ	70mg/m ²	120分点滴	day 1		
術前DCF	ドセタキセル	70mg/m ²	60分点滴	day 1	28日間	術前補助化学療法は3コースまで
	シスプラチニ	70mg/m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間かけて	day 1-5		
DCF	ドセタキセル	30mg/m ²	60分点滴	day 1,15	28日間	
	シスプラチニ	80mg/m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間かけて	day 1-5		
wPTX(7週毎)	パクリタキセル	100mg/m ²	60分点滴	day1,8,15,22,29,36	49日間	
OPDIVO	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
OPDIVO	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
OPDIVO+FP	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間かけて	day 1-5		
	シスプラチニ	80mg/m ²	120分点滴	day 1		
OPDIVO+YERVOY	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1, 22	42日間	
	イピリムマブ	1mg/kg	30分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
胃癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
SP	シスプラチン	60mg/m ²	90分点滴	day 8	35日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-21		
SOX(100)	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
SOX(100)+T(HER)	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1		
SOX(100)+OPDIVO	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1		
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
SOX(100)+KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1		
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
SOX(100)+【6週毎】KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分点滴	day 1	42日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1,22		
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14 day22-35		
SOX(100)+T(HER)+KEYTRUDA	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	S-1 投与量 BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day オキサリプラチンは6又は8コースまで Pembrolizumabは35コースまで 以降はトラスツズマブ+S-1を1年まで
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	90分点滴 2回目以降30分	day1		
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	day 1		
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考	
XP	シスプラチン	80mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14			
XP+T(HER)	シスプラチン	80mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間		
	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1			
XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
XELOX+T(HER)	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1	21日間	カペシタбин 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day	
	カペシタбин	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day 1-14			
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1			

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>XELOX+OPDIVO</u>	ニボルマブ	360mg/body	30分点滴	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>XELOX+KEYTRUDA</u>	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day オキサリプラチンは6コースまで ペムブロリズマブ、カペシタビンは35コースまで
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>XELOX+【6週毎】KEYTRUDA</u>	ペムブロリズマブ	400mg/body	30分点滴	day 1	42日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day XELOXとして6コース(18週)後 Maintenance ペムブロリズマブ+カペシタビン
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1,22		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14 day22-35		
<u>XELOX+T(HER)+KEYTRUDA</u>	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day オキサリプラチンは6又は8コースまで ペムブロリズマブは35コースまで 以降はトラスツズマブ+ゼローダを1年まで
	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	90分点滴 2回目以降は30分点滴	day1		
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>XELOX+VYLOY</u>	ゾルベツキシマブ	800mg/m ² (初回) 600mg/m ² (2回目以降)	120分以上かけて	day 1	21日間	カペシタビン 投与量 BSA<1.36m ² 2400mg/day 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² 3000mg/day 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² 3600mg/day 1.96m ² ≤BSA 4200mg/day
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	day 1		
	カペシタビン	2000mg/m ²	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>mFOLFOX6</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>mFOLFOX6+OPDIVO</u>	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
<u>mFOLFOX6+VYLOY</u>	ゾルベツキシマブ	800mg/m ² (初回) 400mg/m ² (2回目以降)	120分以上かけて	day 1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(bolus)	400mg / m ²	10分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1 ~ 2		
<u>FP+KEYTRUDA</u>	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分点滴	day 1	21日間	シスプラチニンは6コースまで ペムブロリズマブ、フルオロウラシルは35コースまで
	フルオロウラシル	800mg / m ²	24時間持続点滴	day 1~5		
	シスプラチニン	80mg / m ²	120分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>ENHERTU</u>	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	90分点滴 2回目以降30分まで短縮可	day1	21日間	
<u>wPTX</u>	パクリタキセル	80mg/m ²	60分点滴	day1,8,15	28日間	
<u>wPTX+HER</u>	パクリタキセル	80mg/m ²	60分点滴	day1,8,15	28日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
<u>wPTX+RAM</u>	パクリタキセル	80mg/m ²	60分点滴	day1,8,15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1,15		
<u>tri-w アブラキサン</u>	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	30分点滴	day1	21日間	
<u>w アブラキサン</u>	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分点滴	day1,8,15	28日間	
<u>wアブラキサン+RAM</u>	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	30分点滴	day1,8,15	28日間	
	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1,15		
<u>CPT-11[A法]</u>	イリノテカン	100mg/m ²	90分点滴	day 1,8,15	28日間	
<u>CPT-11[B法]</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1,15	35日間	
<u>CPT-11[150]</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1	14日間	
<u>CPT-11[B法]+HER</u>	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1,15	35日間	
	トラスツズマブ	8mg/kg(初回) 6mg(2回目以降)	90分点滴 30分点滴へ短縮可	day 1	21日間	
<u>RAM</u>	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
<u>5FU+Levofolinate</u>	レボホリナート	250mg / m ²	120分点滴	day1,8,15,22,29,36	56日間	
	フルオロウラシル(bolus)	600mg / m ²	10分点滴	day1,8,15,22,29,36		
<u>OPDIVO</u>	ニボルマブ	240mg/body	30分点滴	day 1	14日間	
<u>OPDIVO</u>	ニボルマブ	480mg/body	30分点滴	day 1	28日間	
<u>S-1[A法](4投2休)</u>	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
<u>S-1[B法](2投1休)</u>	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	
<u>Lonsurf(TAS-102)</u>	ロンサーフ	添付文書参照のこと	1日2回 朝夕食後内服	day1-5、day8-12	28日間	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
-------	-----	-----	------	-----	--------	----

GIST

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>SUTENT</u>	スニチニブ	50mg /day	1日1回 内服	day 1-28	42日間	
<u>Stivarga</u>	レゴラフェニブ	160mg	1日1回 食後内服	day1-21	28日間	

肝癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>RAM</u>	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	day 1	14日間	
<u>TECENTRIQ + BV</u>	アテゾリズマブ	1200mg/body	60分点滴	day 1	21日間	
	ペバシズマブ	15mg/kg	90分点滴	day 1		
<u>Stivarga</u>	レゴラフェニブ	160mg	1日1回 食後内服	day1-21	28日間	
<u>IMFINZI + IMJUDO</u>	トレメリムマブ	300mg/body	60分点滴	day 1	28日間	トレメリムマブは初回のみ
	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1		
<u>IMFINZI</u>	デュルバルマブ	1500mg/body	60分点滴	day 1	28日間	
<u>OPDIVO + YERVOY</u>	ニボルマブ	80mg/body	30分点滴	day 1	21日間	4コースで終了 5コース目以降ニボルマブ480mg/bodyを28日間投与
	イピリムマブ	3mg/kg	30分点滴	day 1		

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
肺癌						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>GEM</u>	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
<u>GEM+S-1</u>	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	BSA<1.25m ² 60mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 80mg/day 1.50m ² ≤BSA 100mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>NAC GEM+S-1</u>	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8	21日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14		
<u>GEM+アブラキサン</u>	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m ²	30分点滴	day1,8,15	28日間	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day1,8,15		
<u>GEM+TARCEVA</u>	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分点滴	day 1,8,15	28日間	
	エルロチニブ	100mg	1日1回 空腹時	連日内服		
<u>mFOLFIRINOX</u>	オキサリプラチン	85mg / m ²	120分点滴	day 1	14日間	
	イリノテカン	150mg/m ²	90分点滴	day 1		
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
<u>オニバゾド(nal-IRI)+FL</u>	イリノテカン(リポソーム製剤)	70mg/m ² *1	90分点滴	day 1	14日間	※1 UGT1A1遺伝子多型への減量開始用量は添付文書参照
	レボホリナート	200mg / m ²	120分点滴	day 1		
	フルオロウラシル(civ)	2400mg / m ²	46時間持続点滴	day 1		
S-1[A法]	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-28	42日間	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25m ² ≤BSA < 1.50m ² 100mg/day 1.50m ² ≤BSA 120mg/day
S-1[B法]	S-1	備考参照	1日2回 朝夕食後内服	day1-14	21日間	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
神経内分泌腫瘍						
レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	投与日	1コース期間	備考
<u>CDDP+CPT-11</u>	イリノテカン	60mg/m ²	90分	day 1,8,15	28日間	
	シスプラチニ	60mg/m ²	120分	day 1		
<u>CDDP+ETP (+RT)</u>	エトボシド	100mg/m ²	120分	day 1-3	21～28日間	
	シスプラチニ	80mg/m ²	120分	day 1		
<u>CBDCA+VP-16</u>	エトボシド	80mg/m ²	120分	day 1-3	21日間	
	カルボプラチニ	AUC 5	60分	day 1		