

1 階 3 番「紹介患者受付」

→

1 階 1 1 番受付

安静心筋(^{123}I ーミオMIBG)シンチグラムを受けられる方へ

月 日 () 時 分 (検査薬を注射する時間)

当日は、最初に検査の説明を行います。

1. 妊娠の可能性のある方、妊娠中、授乳中の方は、検査ができません。予約時にお申し出下さい。
2. 安静心筋(^{123}I ーミオMIBG)シンチグラムとは
 - ① 最初に心筋の交感神経機能を反映して集まるRI検査薬を腕の静脈から注射します。
 - ② 注射から、15分後、1回目の心筋シンチグラムの撮影を行います。約25分間仰向けに寝ているだけです。
 - ③ 1回目の撮影終了後、4時間おいて、2回目の心筋シンチグラムの撮影を行います。2回目の撮影開始時間は1回目の撮影終了後にお伝えいたします。
 - ④ 2回目の撮影の検査時間は、約5分間です。

RI検査薬注射

(15分間)

1回目撮影

(約25分間)

(4時間)

2回目撮影

(約5分間)

3. 食事等について
 - ① 検査前における食事制限は特にありません。
 - ② ベンザミド系消化器治療薬(プリンペラン等)、三環抗うつ剤(トフラニール等)などのお薬は、RIの心臓への集積抑制がありますので、担当医師と相談の上、検査前から、検査終了まで中止してください。
 - ③ 昼食は、2回目の撮影が終わるまではなさらないで下さい。水・お茶・ジュース等は飲んでもかまいません(牛乳・アルコール類は除く)。
4. 1回目と2回目の撮影の間は、運動になること(脈拍が上がること)をしないで下さい。
5. 検査時の服装について
上半身 … 男性はボタンのないシャツ等、女性は検査着(下着は着けられません)で行います。
下半身 … ご自身の着衣で結構です。

※RI検査では、検査薬として放射性医薬品という使用日指定の高価な注射薬を使用いたします。患者様におかれましては、体調が良くない、或いは、ご都合が悪くなった等の理由で検査のキャンセル、又は、延期なされる場合には、できるだけ前日までにご連絡頂きますようお願い致します。

【確認事項】

下記事項に当てはまる方は撮影ができない可能性があります。該当欄にチェックをし、必ず主治医もしくは検査担当者にお申し出ください。

☐ 妊娠の可能性がある方 ☐ 持続グルコース測定器(リブレ等)・インスリンポンプがある方

この説明書は、2階RI検査室(25番受付)にご提出下さい。ご意見やご質問がございましたら、下欄に記入して下さい。お電話または受付でのご質問でも構いません。(平日 9:00～17:00)